



# Troubles addictifs

# Troubles addictifs

## SOMMAIRE

Quelques définitions	p. 02
Diagnostic des troubles addictifs	p. 03
Addiction aux drogues illicites	p. 04
Addiction aux médicaments psychotropes	p. 06
Addiction à l'alcool	p. 07
Addiction au tabac	p. 08
Addiction comportementale	p. 08
Soins et accompagnement	p. 09
Où s'adresser ?	p. 09
En savoir plus	p. 11

## Quelques définitions

Les troubles addictifs regroupent : alcoolisme, toxicomanies, tabagisme et addictions comportementales (ex : jeu, internet).

**Les substances psychoactives à risque de dépendance (alcool, tabac, drogues, etc.), agissent sur le circuit de récompense du cerveau.** Ce circuit est impliqué dans le plaisir lié à des comportements, notamment de nutrition et de reproduction de l'espèce. Les substances psychoactives sollicitent anormalement ce circuit naturel et entraînent la possibilité de son déséquilibre permanent. Plus on consomme un produit à des doses toxiques, plus on en subit les conséquences. À l'inverse, moins on consomme un produit, ou si on le consomme à des doses non toxiques, moins on en subit les conséquences<sup>(1)</sup>.

(1) Mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie (MILDT)

On distingue 4 catégories d'utilisateurs<sup>(2)</sup> :

- **expérimentateurs** : ont utilisé une substance « au moins une fois dans leur vie » ;
- **occasionnels** : utilisent une substance « au moins une fois dans l'année » ;
- **réguliers** : consomment tous les jours ;
- **consommateurs à problème** : ont des problèmes **d'abus et de dépendance**.

## Se rétablir de troubles addictifs

Les troubles addictifs peuvent avoir des conséquences importantes sur la vie affective, familiale, professionnelle et sociale.

Malgré ces difficultés il est possible de se rétablir de ces troubles.

## Diagnostic des troubles addictifs

Les classifications distinguent **la dépendance** (l'addiction), et **l'usage nocif** ou **l'abus de substance**.

**Dépendance** : ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques, survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psychoactive, associés à :

- un désir puissant de prendre la substance ;
- une difficulté à contrôler la consommation ;
- une poursuite de la consommation malgré les conséquences nocives ;
- un désinvestissement progressif des autres activités et obligations, au profit de cette substance ;
- une tolérance accrue et parfois un syndrome de sevrage physique (Cim-10).

**Usage nocif** : mode de consommation d'une substance psychoactive qui est préjudiciable pour la santé physique et/ou psychique (CIM-10).

(2) Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT)



Les addictions les plus répandues concernent le tabac (nicotine) et l'alcool. Viennent ensuite le cannabis et, loin derrière, les opiacés (héroïne, morphine), la cocaïne, les amphétamines et dérivés de synthèse. Il existe également des addictions liées à des activités (jeu d'argent, jeux vidéo, sexe ou les achats compulsifs).<sup>(3)</sup>

## Addiction aux drogues illicites<sup>(4)</sup>

### Héroïne et opiacés

#### • Description

Poudre blanche (ou grise, ou brown, ou rose) qui peut être sniffée (prise), shootée (injectée), plus rarement fumée (dans du tabac ou chauffée sur une feuille d'aluminium).

Les effets recherchés sont le « flash » (sensation de plaisir intense), l'anesthésie et l'euphorie. Le nombre d'expérimentateurs d'héroïne en France parmi les 11-75 ans est estimé à 600 000.

#### • Dépendance et sevrage

La dépendance à l'héroïne est marquée par une forte tolérance : tout usage régulier entraîne rapidement une augmentation des doses.

Elle produit aussi une forte dépendance physique. Une fois l'organisme habitué au produit, l'arrêt de l'intoxication provoque un syndrome de sevrage ou « manque physique » (douleurs diffuses, angoisse, insomnie, nausées et vomissements, diarrhée).

#### • Risques

Les risques sont :

- la surdose, qui peut conduire au coma avec dépression respiratoire ;
- la contamination par le virus de l'hépatite C (64% des utilisateurs) ou du sida (13%)<sup>(5)</sup>.

### Cocaïne et crack

#### • Description

La **cocaïne** est une poudre blanche qui peut être prise ou injectée. Les effets recherchés sont le sentiment de maîtrise de soi, d'augmentation des capacités intellectuelles, de « lucidité », de simplicité. Comme les amphétamines, elle augmente la vigilance, empêche le sommeil et gomme toute sensation de fatigue.

(3) Dossier Addictions – Décembre 2014 - [www.inserm.fr](http://www.inserm.fr)

(4) Source [www.ofdt.fr](http://www.ofdt.fr)

(5) usagers de drogues ayant injecté au moins une fois dans leur vie (chiffre 2011).

**Le crack** est une forme particulière de cocaïne qui est fumée. L'effet survient en quelques secondes, plus rapidement que lors d'une injection, mais il dure moins longtemps. En 2014, 5,6 % des 18-64 ans ont expérimenté la cocaïne.

- **Dépendance et sevrage**

La dépendance est marquée par des impulsions irrésistibles à reprendre du produit (le « craving »).

Les sevrages sont souvent suivis de phases dépressives.

L'utilisation chronique de cocaïne peut entraîner des épisodes délirants de type paranoïde (idées de persécution), des états d'excitation avec agressivité voire des passages à l'acte

- **Risques**

La cocaïne augmente le rythme cardiaque et la tension artérielle, avec des risques vitaux importants, notamment en cas de surdose.

## Ecstasy

- **Description**

La MDMA (3,4 méthylendioxyamphétamine), principe actif de l'ecstasy, appartient à la classe chimique des amphétamines. L'ecstasy se présente en comprimés qui contiennent aussi souvent d'autres substances, dont des médicaments divers. Il est surtout utilisé dans les milieux festifs « techno » : rave-parties, boîtes de nuit...

Les effets recherchés sont l'euphorie, le sentiment d'éveil et la facilitation des contacts.

En 2014, 3,8% des jeunes de 17 ans ont expérimenté la MDMA.

- **Dépendance et sevrage**

L'ecstasy peut entraîner une forme de dépendance et comporte des risques psychiques : crises de panique, épisodes aigus avec hallucinations.

- **Risques**

Il a pu être responsable d'accidents par hyperthermie dans certaines soirées festives. Sa neurotoxicité au long cours est toujours discutée.

## Cannabis

- **Description**

Substance illicite la plus utilisée au monde. Les feuilles et les tiges séchées constituent la marijuana ou herbe, fumée sous forme de joints (cigarettes), mais parfois ingérée par voie orale. La résine constitue le haschisch ou shit, le plus souvent fumé, mélangé à du tabac.

Le principe actif de la plante est le tétrahydrocannabinol (THC). La concentration en THC fait la différence entre les variétés de cannabis recherchées par les utilisateurs. En France, 3% des 18-64 ans sont des fumeurs réguliers.

.../...

.../...

### • **Dépendance et sevrage**

La dépendance est plus rare que pour d'autres drogues, mais elle existe, en particulier la dépendance psychique.

### • **Risques**

Les dangers du cannabis

sont à la fois de type tabac (pour les bronches et les poumons), et de type alcool (pour l'ivresse). La fumée de cannabis contient des produits cancérigènes en grande quantité. L'ivresse euphorique peut faire place à des crises d'angoisse, voire de « parano » et, chez des personnes fragiles, déclencher un état psychotique.

## **Évaluation de la consommation de cannabis - Test CAST**

- Avez-vous déjà fumé du cannabis avant midi ?
- Avez-vous déjà fumé du cannabis lorsque vous étiez seul(e) ?
- Avez-vous déjà eu des problèmes de mémoire quand vous fumiez du cannabis ?
- Des amis ou des membres de votre famille vous ont-ils déjà dit que vous deviez réduire votre consommation de cannabis ?
- Avez-vous déjà essayé de réduire votre consommation sans y arriver ?
- Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de votre consommation de cannabis (disputes, mauvais résultats...).

**3 réponses positives ou plus = consommation à problèmes.**

## **Addiction aux médicaments psychotropes**

Les tranquillisants et les somnifères (anxiolytiques et hypnotiques de la famille des benzodiazépines) entraînent 2 types de dépendances.

**Dépendance à faible dose :** celle des personnes qui ont commencé par un « petit » tranquillisant ou un « petit » somnifère et qui, au bout de plusieurs années, n'arrivent plus à s'en passer.

Il n'y a pas d'augmentation spectaculaire des doses, ni d'ivresses ou de phases d'amnésie antérograde. Les inconvénients majeurs de ce type de dépendance au long cours sont :

- des troubles de la mémoire ;
- des difficultés de concentration ;
- une aggravation de l'affaiblissement des fonctions intellectuelles lié à l'âge des chutes et des accidents de la voie publique.

**Dépendance à forte dose** : de type toxicomaniaque.

Souvent les usagers de drogues utilisent ces substances comme calmants (pour « faire parachute » après une montée trop forte de cocaïne, de crack, ou d'amphétamines) ou comme enivrants (pour remplacer l'euphorie de l'héroïne).

Associés à l'alcool, ils en augmentent les effets et conduisent souvent à des épisodes de passage à l'acte avec amnésie antérograde (oubli à mesure). Ces médicaments ont aussi pu être utilisés comme « drogues de soumission » de façon criminelle (viols, vols...). En 2010, 18 % des 18-75 ans déclarent avoir pris au moins un médicament psychotrope au cours des 12 derniers mois.

## Addiction à l'alcool

C'est la substance psychoactive la plus consommée en France. Les expérimentateurs représentent 46,7 millions de personnes, 8,7 millions de réguliers et 3,4 millions de consommateurs à problème ou à risque de dépendance.

**Un usage nocif** peut entraîner cancers, maladies du foie et du pancréas, troubles cardio-vasculaires, maladies du système nerveux et troubles psychiques (anxiété, dépression, troubles du comportement). En 2015, on estime que 49 000 décès par an sont attribuables à l'alcool.

**Le simple usage** (non abusif), peut être défini comme une consommation d'alcool qui n'entraîne pas de conséquences sur la santé du consommateur, ni de troubles du comportement ayant des conséquences sur l'entourage.

Il existe des **dépendances** acquises très tôt, chez des personnes jeunes, qui recherchent l'ivresse et perdent facilement le contrôle de leur consommation. Mais il existe aussi des dépendances installées progressivement, chez des personnes qui boivent régulièrement, avec peu d'épisodes d'ivresse. L'alcoolodépendance, malgré sa fréquence et la gravité de ses conséquences, est trop souvent prise en charge très tardivement, du fait des difficultés des personnes à admettre le problème et à demander de l'aide.

**Un verre d'alcool standard, un verre de vin, un petit apéritif ou une bière contiennent tous 10 grammes d'alcool.**

**Il est conseillé de ne pas dépasser 2 verres standard par jour pour les femmes et 3 pour les hommes, avec au moins un jour par semaine sans alcool.**

## Évaluation de la consommation d'alcool - Test DETA

- Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation de boissons alcoolisées ?
- Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation de boissons alcoolisées ?
- Avez-vous déjà eu l'impression que vous buviez trop ?
- Avez-vous déjà eu besoin d'alcool dès le matin pour vous sentir en forme ?

**4 réponses positives = consommation à problèmes.**

## Addiction au tabac

Il existe en France 38,2 millions d'expérimentateurs et 13 millions de fumeurs dépendants. Un tiers des expérimentateurs deviennent dépendants : pourcentage important, car pour les drogues les plus dures (héroïne ou crack), on estime que 10 à 20 % seulement des expérimentateurs deviendront dépendants. Même si la dépendance physique ne touche que 20 à 30 % des fumeurs, la dépendance psychologique ou comportementale est très importante.

**En chiffres absolus, le tabac est la substance psychoactive qui entraîne le plus de décès, et il faut ajouter les répercussions sur la grossesse : 20% des avortements spontanés lui sont imputables.**

## Addiction comportementale

La dépendance au jeu d'argent et de hasard est la principale « addiction sans drogue ». En France, 0,4% de la population correspond au critère de jeu pathologique, auxquels s'ajoutent 0,9% de joueurs à problèmes. Elle est responsable de surendettements, de dépressions, voire d'actes de délinquance. Les plus addictifs sont les jeux à résultat instantané (machines à sous de casinos, Rapido, cartes à gratter et courses sur écran). Comme pour l'alcool, les personnes ont beaucoup de difficultés à parler de leur problème et à demander de l'aide.

Dans le cas du jeu, ce phénomène est encore aggravé par l'idée qu'un gain miraculeux suffirait à résoudre tous les problèmes de dettes : les joueurs tentent de « se refaire », et mettent longtemps à comprendre que seul l'arrêt du jeu peut leur permettre d'en sortir.



## Soins et accompagnement

Des interventions brèves, des conseils simples peuvent aider la personne à prendre conscience de ses difficultés et à demander de l'aide. La plupart des addictions sont des problématiques au long cours, avec des rechutes. Certaines doivent être prises en charge par des équipes pluridisciplinaires dans des lieux spécialisés. Le traitement présente plusieurs dimensions :

### Psychothérapie

Elle apporte un soutien et une information adaptée sur les mécanismes de la dépendance, les effets du sevrage, les risques et modalités des rechutes. Elle propose d'autres façons de faire face au stress, aux difficultés (ex : thérapies de type cognitivo-comportemental). Elle permet de prendre du recul par rapport à ses problèmes, son histoire et le sens que peut y prendre l'addiction.

### Hospitalisation

Indiquée dans certains sevrages (alcool, drogues, médicaments) ou lors d'épisodes dépressifs. Les centres de post-cures, les séjours en centres résidentiels ou en famille d'accueil peuvent permettre un changement de contexte, une rupture avec un mode de vie trop lié à la conduite addictive.

### Traitements médicamenteux

Les traitements de substitution (pour les opiacés et le tabac) ou les traitements de sevrage, ou pour minimiser les risques de rechute peuvent être prescrits, ainsi que des traitements contre la dépression ou l'angoisse.

### Soutien social

Le soutien et les conseils aident à soigner les addictions. Parfois l'accompagnement dans des démarches sociales peut être utile. L'accueil et le soutien de l'entourage est essentiel. Des séances de thérapie familiale peuvent être proposées. Des groupes de parole existent pour la plupart des addictions

### Entraide mutuelle

Les associations d'anciens dépendants apportent soutien et entraide pour les personnes touchées et leurs proches.

## Où s'adresser ?

### Médecin traitant ou infirmière scolaire

Il est conseillé de demander l'avis de son médecin habituel qui peut orienter vers une consultation ou un service spécialisé, en fonction de la gravité de la situation. L'infirmière scolaire peut jouer ce rôle auprès des jeunes.

## Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)

Ces centres assurent l'accompagnement médical, psychologique et social des personnes ayant des problèmes d'addiction.

## Consultations cannabis

Présentes dans tous les départements, gratuites et anonymes, elles aident les consommateurs et leur famille (information, bilan, aide à l'arrêt, soins...).

## Consultations tabac

Situées dans les hôpitaux généraux, elles aident au sevrage tabagique et prennent en charge les fumeurs les plus dépendants et les personnes ayant déjà souffert d'une maladie liée au tabac.

## Points Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)

Lieux d'accueil, d'écoute et de parole pour les jeunes les plus en difficulté. Une de leurs missions est la prévention des conduites à risques.

## Centres médico-psychologiques (CMP)

Les services de psychiatrie publique proposent des soins pour les troubles psychiques, pris en charge par la Sécurité sociale. Se renseigner au CMP le plus proche du domicile.

## Institut fédératif des addictions comportementales (IFAC)

Activité de recherche, formation et information sur le jeu excessif et pathologique.

[www.ifac-addictions.fr](http://www.ifac-addictions.fr)

**Par téléphone ou par internet, 7 jours sur 7, vous pouvez poser vos questions, vous informer, trouver des adresses utiles, demander de l'aide, de manière confidentielle et anonyme.**

- **Drogue Info Service** : 0 800 23 13 13 - [www.drogues-info-service.fr](http://www.drogues-info-service.fr)
- **Écoute Cannabis** : 0 980 980 940
- **Tabac info service** : 39 89 - [www.tabac-info-service.fr](http://www.tabac-info-service.fr)
- **Alcool info Service** : 0 980 980 930 - [www.alcool-info-service.fr](http://www.alcool-info-service.fr)
- **Joueurs Info Service** : 09 74 75 13 13- [www.joueurs-info-service.fr](http://www.joueurs-info-service.fr)
- **Fil Santé Jeunes** : 0 800 235 236 - [www.fildsantejeunes.com](http://www.fildsantejeunes.com)

## Associations d'usagers, de proches et d'accompagnement

Liste non exhaustive.

Alcooliques anonymes  
09 69 39 40 20  
[www.alcooliques-anonymes.fr](http://www.alcooliques-anonymes.fr)

Al-Anon  
Aide pour l'entourage de la personne alcoolique  
01 42 81 97 05  
[www.al-anon.fr](http://www.al-anon.fr)

Association française des dépendants  
en rétablissement (AFDER)  
info@afder.org  
www.afder.org

Association nationale de prévention  
en addictologie et alcoologie (ANPAA)  
www.anpaa.asso.fr

Croix Bleue  
189, rue Béliard - 75018 Paris  
01 42 28 37 37  
cbleue@club-internet.fr  
www.croixbleue.fr

Fédération nationale des associations  
d'usagers en psychiatrie (FNAPsy)  
33, rue Daviel - 75013 Paris  
01 43 64 85 42  
www.fnapsy.org

Narcotiques anonymes France  
01 43 72 12 72  
www.narcotiquesanonymes.org

SOS Joueurs  
1 rue Rabelais - 92170 Vanves  
09 69 39 55 12  
contact@sosjoueurs.org  
www.sosjoueurs.org

Union nationale des familles et amis  
de personnes malades et/ou handicapés  
psychiques (UNAFAM)  
12, Villa Compoint - 75017 Paris  
01 53 06 30 43  
écoute famille 01 42 63 03 03  
secretariatdg@unafam.org  
www.unafam.org

Vie libre Mouvement d'anciens buveurs  
vielibre national@vielibre.org  
www.vielibre.org

## En savoir plus

Mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie (MILDT) :  
www.drogues.gouv.fr

Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) : www.ofdt.fr

Santé publique France : www.santepubliquefrance.fr

Addict'Aides : Portail collaboratif d'information, de ressources et d'échange.  
www.addictaides.fr

Centre de documentation Marmottan : bibliothèque médicale sur les addictions (sur  
RV). www.hopital-marmottan.fr

Haute autorité de santé : www.has-sante.fr

Agence nationale de sécurité du médicament : ansm.sante.fr

Base de données des médicaments : base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

Institut fédératif des addictions comportementales : www.ifac-addictions.fr

Prescrire : information indépendante sur les médicaments www.prescrire.org

Psycom : Brochures, vidéos, livres témoignages www.psycom.org

- Belkacem A., Reynaud M., Venisse J.L., Du jeu au jeu pathologique, Eds Maxima, 2011
- Fouilland P, (dir), L'aide-mémoire d'addictologie, Dunod, 2010
- INPES, Drogues et conduites addictives, 2015  
Téléchargeable www.drogues-info-service.fr
- Morel A, Couteron JP, Addictologie clinique, Toubiana T. (dir.), Puf, 2011
- OFDT, Drogues, Chiffres clés, 6e édition, juin 2015
- OFDT, Les niveaux et pratiques des jeux de hasard et d'argent en 2010, n°77, septembre 2011
- Pachoud B., Se rétablir de troubles psychiatriques : un changement de regard sur le devenir des personnes. Information psychiatrique, 2012/4 (vol. 88)

Le Psycom est un organisme public d'information, de formation et de lutte contre la stigmatisation en santé mentale.

Le Psycom édite 6 collections de plaquettes d'information :

- Troubles psychiques
- Psychothérapies
- Médicaments psychotropes
- Soins, accompagnements et entraide
- Droits en psychiatrie
- Santé mentale et...

psycom 

11, rue Cabanis - 75674 Paris Cedex 14  
facebook.com/psycom.org - @Psycom\_actu  
www.psycom.org - contact@psycom.org

**Rédactrice en chef :** Aude Caria (directrice, Psycom).

**Rédaction :** Dr Marc Valleur (psychiatre, Centre Marmottan-GPS Perray-Vaucluse), Aude Caria (directrice, Psycom) et Céline Loubières (chargée de mission, Psycom).

**Relecture :** Dr Gérard Bourcier (psychiatre, Hôpitaux de Saint-Maurice), Dr François Caroli (psychiatre, CH Ste-Anne), Caroline David (bénévole, UNAFAM), Claude Finkelstein (présidente, FNAPsy), Dr Vassilis Kapsambelis (psychiatre, ASM13), Dr Christiane Santos (psychiatre, GPS Perray-Vaucluse) et Dr Norbert Skurnik (psychiatre, EPS Maison-Blanche).

**Illustration :** AdobeStock (libre de droits).